

โบต็อกซ์...สวย...อันตราย!

การฉีดโบต็อกซ์อันตราย.....ใครรู้บ้าง.....ปัจจุบันกระแสความนิยมการใช้โบต็อกซ์ เพื่อความงามเพิ่มขึ้น ผู้ฉีดโบต็อกซ์ส่วนใหญ่อายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 19-20 ปี นอกจากนี้ มีผู้ที่ฉีดโบต็อกซ์อย่างไม่ถูกต้องเข้ารับการแก้ไข ส่วนใหญ่มาจากการใช้สารเติมเต็มที่เรียกว่า Filler (ฟิลเลอร์) ซึ่งมีความนิยมมาก เพราะได้ผลในการปรับโครงสร้างใบหน้า เช่น การเสริมจมูก คาง เติมร่องลึก รอยบวม⁽¹⁾ ทั้งนี้โบต็อกซ์จัดเป็นสารสกัดจากแบคทีเรียที่เรียกว่า คลอสทริเดียมโบทูลินัม ซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกับที่พบในหน่อไม้ปิ้ง มีพิษต่อร่างกาย ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของระบบปลายประสาท ทำให้กล้ามเนื้อขยับตัวน้อยลง กล้ามเนื้ออาจลีบ⁽¹⁾



Before



After



ผลข้างเคียงของโบต็อกซ์ คือ ปวดศีรษะคลื่นไส้ คัน เจ็บคอ มีไข้ มีอาการคล้ายเป็นหวัด ไปจนถึงเกิดอาการเจ็บปวดและเกิดแผลซ้ำบริเวณที่ฉีด หากใช้มากหรือไม่ถูกต้อง มีสิทธิ์เข้ากระแสเลือด อาจเสียชีวิตได้

ส่วนคนที่ฉีดโบต็อกซ์บ่อยๆ จะเกิดผลข้างเคียงที่คาดไม่ถึง คือ ใบหน้าคล้ายหน้ากาก กลายเป็นมนุษย์ไร้อารมณ์ ไร้ความรู้สึก คล้ายกับอาการที่พบในผู้ป่วยที่โดนพิษโบต็อกซ์ตามธรรมชาติ โบต็อกซ์อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่ายและได้มาก การควบคุมปริมาณของโบต็อกซ์ให้ถูกต้องเหมาะสม จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง⁽²⁾

ควรระวังที่หลายคนอาจไม่รู้ เช่น การดื่มแอลกอฮอล์อาจจะมีผลทำให้โบต็อกซ์ออกฤทธิ์ได้ไม่ดี หรืออาจแย่ไปกว่านั้นอีก ก็คือ ทำให้เกิดริ้วรอยแผลบริเวณตำแหน่งที่ฉีดโบต็อกซ์ได้อีกด้วย และกรณีที่เลวร้ายที่สุด การฉีดโบต็อกซ์ที่ผิดขนาดไปมากๆ อาจทำให้เสียชีวิตได้เช่นกัน⁽²⁾

ดังนั้นการฉีดโบต็อกซ์จำเป็นต้องมีแพทย์ที่มีความรู้เฉพาะทางและมีประสบการณ์ คุณภาพของยาต้องดีมีความบริสุทธิ์สูง

ที่มา : (1) เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 28 ก.ค.2554 www.thairath.co.th/content/edu/189605

: (2) เว็บไซต์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) www.thaihealth.or.th/node/7845

