

■ เพศ

จากข้อมูลรณบัตร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2542-2551 พบว่าเพศชายมีอัตราการเสียชีวิตจากการตักน้ำ จมน้ำสูงกว่าเพศหญิงประมาณ 2 เท่าตัว และมีแนวโน้มอัตราการเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2549 และเริ่มลดลงในปี พ.ศ. 2550 เช่นเดียวกับในภาพรวม (ตาราง 8) (ภาพ 8) โดยอัตราการเสียชีวิตของเพศชายในภาคใต้สูงกว่าเพศหญิงประมาณ 2.5 เท่าตัว (ตาราง 9)

ตาราง 8

จำนวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คน ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จากการตักน้ำ จมน้ำ ประเทศไทย จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2542-2551


		2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551
ชาย	จำนวน	821	933	917	1,032	952	935	983	985	843	821
	อัตรา	10.1	11.6	11.5	14.2	13.2	13.2	14.1	14.3	12.4	12.2
หญิง	จำนวน	428	479	527	556	520	536	566	497	454	406
	อัตรา	5.3	6.1	6.7	8.1	7.7	8.0	8.6	7.7	7.1	6.4
รวม											
	จำนวน	1,249	1,412	1,444	1,588	1,472	1,471	1,549	1,482	1,297	1,229
	อัตรา	7.7	8.9	9.1	11.2	10.5	10.7	11.5	11.1	9.8	9.4

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลรณบัตร. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วิเคราะห์: สัม เอกเฉลิมเกียรติและสุชาดา เกิดมงคลการ. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ภาพ 8

อัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คน ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จากการตักน้ำ จมน้ำ ประเทศไทย
จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2542-2551



แหล่งข้อมูล: ข้อมูลมรณบัตร. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วิเคราะห์: สัม เอกเฉลิมเกียรติและสุชาดา เกิดมงคลการ. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ตาราง 9

อัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คน ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จากการตักน้ำ จมน้ำ ประเทศไทย
จำแนกรายภาคและเพศ ปี พ.ศ. 2551

ภาค	ชาย	หญิง	รวม
เหนือ	108	9.4	69
ตะวันออกเฉียงเหนือ	344	14.7	184
กลาง	268	12.3	115
ใต้	103	9.6	38
รวม	823	12.2	406

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลมรณบัตร. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วิเคราะห์: สัม เอกเฉลิมเกียรติและสุชาดา เกิดมงคลการ. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

■ อายุ

จากข้อมูลมรณบัตร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ พบว่าเมื่อจำแนกรายกลุ่มอายุ ค่าเฉลี่ยอัตราการเสียชีวิตจากการตักน้ำ จมน้ำในช่วงปี พ.ศ. 2541-2552 ของกลุ่มเด็กอายุ 0-4 ปีจะสูงกว่ากลุ่มเด็กอายุ 5-9 ปีเล็กน้อย แต่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา จะเห็นว่าอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มเด็กอายุ 5-9 ปีสูงกว่าในกลุ่มเด็กอายุ 0-4 ปี (ตาราง 10) (ภาพ 9)

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตจากการตักน้ำ จมน้ำ ของกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีกับทุกกลุ่มอายุ พบว่าอัตราการเสียชีวิตของกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (อัตราต่อประชากร 100,000 คนเท่ากับ 7.7-11.5) สูงกว่าทุกกลุ่มอายุ (อัตราต่อประชากร 100,000 คนเท่ากับ 5.0-7.5) (ตาราง 10) (ภาพ 10)

ตาราง 10

จำนวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คน ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีและทุกกลุ่มอายุ จากการตักน้ำ จมน้ำ ประเทศไทย จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2542-2551

ปี	()									
	0-4		5-9		10-14		<15			
	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
2542	531	10.1	501	9.3	217	4.0	1,249	7.7	3,015	5.0
2543	587	11.3	582	10.9	243	4.5	1,412	8.9	3,859	6.3
2544	591	11.5	571	10.8	282	5.3	1,444	9.1	3,811	6.2
2545	601	14.0	673	13.4	314	6.5	1,588	11.2	4,218	6.7
2546	590	14.3	608	12.2	274	5.6	1,472	10.5	4,134	6.6
2547	548	13.6	637	13.2	286	5.8	1,471	10.7	4,202	6.7
2548	528	13.2	704	15.1	317	6.5	1,549	11.5	4,458	7.2
2549	521	13.1	641	14.3	320	6.5	1,482	11.1	4,666	7.5
2550	473	11.9	512	11.9	312	6.3	1,297	9.8	4,098	6.5
2551	465	11.6	503	12.0	261	5.3	1,229	9.4	4,065	6.4

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลมรณบัตร. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วิเคราะห์: สัม เอกเฉลิมเกียรติและสุชาดา เกิดมงคลการ. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข