



ภัยยาเสี้ยว...

เสียทรัพย์สิน เสียใจ อันตรายถึงชีวิต

NEWS

“ยาเสี้ยว” ระบาด! สาวนั่งตริ๊งก์
ยังโดน ร้อนรุ่ม จะแก้ผ้าตลอดเวลา”¹

“เจออีกราย ! สาวโดนหยอดยา
ร้อนวูบวาบ-อยากมีเซ็กส์”²

“หนุ่มโพสต์เตือน
แฟนสาวโดนหยอด
‘ยาเสี้ยว’ เกือบถอดเสื้อผ้าในผับ”³



DAILY NEWS



“ยาเสี้ยว” คือสารเคมีจำพวก
ยาอัลปราโซแลม ยามิดาโซแลม
หรือโดมิคุม ยาฟลูโนตราซิแพม
และสาร GHB ซึ่งถูกนำมาใช้ในทางที่ผิด

โดยพวกมิจฉาชีพแอบลักลอบผสมเครื่องดื่มให้กับเหยื่อ
ที่เป็นหญิงสาวนักเที่ยวตามแหล่งบันเทิง ผับ บาร์
เพื่อหวังก่ออาชญากรรม จึงทรัพย์/ลักทรัพย์
ล่วงละเมิดทางเพศ/ข่มขืน เป็นต้น

ลักษณะ และผลข้างเคียงของยา

1

ยาบางชนิดไม่มีกลิ่นและรสชาติ
เมื่อผสมกับเครื่องดื่ม
ทำให้สังเกตได้ยาก

2

ยาออกฤทธิ์ได้รวดเร็ว
ไม่เกิน 30 นาที
หลังจากรับประทาน

3

ทำให้เกิดอาการมึนงง ง่วงซึม
รวมถึงทำให้รู้สึกเคลิ้ม
หรือกระตุ้นให้อยาก
มีเพศสัมพันธ์

4

ทำให้สูญเสีย
ความทรงจำช่วงขณะ

5

ทำให้หมดสติอาจถูกลัก
ทรัพย์หรือล่วงละเมิด
ทางเพศได้

6

หากได้รับยาเกินขนาด
มีโอกาสร้อง
และเสียชีวิตได้

การป้องกันตนเอง

1

ไม่รับเครื่องดื่ม
หรืออาหาร
จากคนแปลกหน้า

2

ถ้าจำเป็นต้อง
สังสรรค์
ควรไปเป็นกลุ่ม

3

อย่าไว้วางใจคนแปลกหน้า
ที่เข้ามาตีสัก

4

หากรู้ตัวว่าโดนหยอดยา
ต้องตั้งสติโทรศัพท์หา
คนในครอบครัว/
บุคคลที่ไว้วางใจ
เพื่อแจ้งที่อยู่ปัจจุบัน
ให้ทราบ

5

หลีกเลี่ยงการเที่ยว
สถานบันเทิง
ที่ไม่น่าไว้วางใจ

6

งดดื่มเครื่องดื่ม
ผสมแอลกอฮอล์ทุกชนิด
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ทุกประเภท

แม้ขาดก้วไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไป แต่ปัจจุบันยังพบว่ามีการลักลอบจำหน่ายกัน
อย่างแพร่หลายทางอินเทอร์เน็ต ดังนั้น พ่อแม่/ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องร่วมกันสอดส่องดูแลป้องกันการมีผู้ผสมใช้สารเสพติด รวมถึงการไม่อนุญาตให้เด็กและเยาวชน
อายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการสถานบันเทิง สำหรับหญิงสาวที่ชื่นชอบการปาร์ตี้
ต้องเฝ้าระวังตนเองและคนใกล้ชิดเป็นพิเศษ

เพราะภัยของยาเสี้ยวไม่ใช่แค่ทำให้เสียตัว หรือเสียใจ แต่อาจอันตรายถึงกับชีวิต...

กระทรวง พม.ห่วงใยในประเด็นปัญหาดังกล่าว พบปัญหาแจ้ง 1300